

**COMPLEXO SENNA**  
**ALMEIDA PRADO**

# 46

**FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO**  
**COMPRIMIDOS** - Frasco com 60 comprimidos de 0,150 g  
**VIA DE ADMINISTRAÇÃO: VIA ORAL**

#### **USO ADULTO**

**COMPOSIÇÃO** - Cada comprimido contém:

Picossulfato de sódio.....	0,005 g
Cassia senna 1DH.....	0,020 g
Polygonum punctatum 1CH.....	0,015 g
Collinsonia canadensis 1CH.....	0,015 g
Excipiente q.s.p.....	0,150 g

Excipiente: Lactose, Celulose Microcristalina, Estearato de Magnésio.

#### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

##### **PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é um laxativo de contato, indicado como auxiliar no tratamento da prisão de ventre.

##### **COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

É um medicamento que estimula o funcionamento do intestino, facilitando o amolecimento das fezes e sua eliminação. Este medicamento demora de 6 a 12 horas para produzir efeito.

##### **QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento não deve ser utilizado por pessoas que tenham doenças no intestino ou que apresentem desidratação grave. Pacientes que fizeram cirurgia recente no intestino, inclusive apendicite, ou que sofram fortes dores no abdômen com náuseas e vômitos, também não devem utilizar este medicamento. Pessoas que apresentem alergia a picossulfato de sódio ou algum componente da formulação não devem utilizar este medicamento.

**Crianças não devem tomar este medicamento sem orientação médica.**

**Este medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez e amamentação sem orientação médica.**

**Mulheres que estejam amamentando não devem utilizar este medicamento.**

**Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.**

##### **O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento não deve ser tomado junto com antibióticos ou imediatamente após tratamento com antibióticos, pois os antibióticos podem prejudicar o efeito laxante.

Pacientes que fazem uso de medicamentos diuréticos ou adrenocorticóides somente poderão tomar este medicamento sob orientação médica, pois doses altas deste medicamento junto com diuréticos ou adrenocorticóides podem causar desequilíbrio eletrolítico, e este desequilíbrio pode causar aumento da sensibilidade aos glicosídeos cardíacos.

**Este medicamento contém LACTOSE.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

### **ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

O prazo de validade deste medicamento é de 24 meses a partir da data de fabricação (vide embalagem), desde que seja conservado em local fresco e seco. Manter em temperatura ambiente (15 ° a 30 ° C), protegido da luz e da umidade. Fechar a embalagem adequadamente logo após o uso.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido.**

**Guarde-o em sua embalagem original.**

**Os comprimidos são brancos e com o símbolo AP gravado em um dos lados.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

### **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Uso adulto: é de 1 ou 2 comprimidos à noite, ao deitar ou à critério médico por via oral.

Dose máxima diária: 4 comprimidos.

Os comprimidos poderão ser ingeridos com água.

Mantenha sempre a dose ou o modo de tomar sugerido nesta bula. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e devem estar sob a responsabilidade do prescritor.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure a orientação do seu médico ou cirurgião-dentista.**

### **O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Pode ocorrer desconforto, cólicas intestinais e diarreia em altas dosagens. No caso de aparecimento de reações desagradáveis graves, procure orientação médica.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.**

### **O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Caso alguém use uma quantidade maior que a indicada deste medicamento, pode ocorrer diarreia e fortes dores de barriga. Aumente a ingestão de líquidos e procure ajuda emergencial médica.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

Registro MS 1.0266.0051.002-5

Farmacêutica Responsável: Dra. Zuleika Carvalho - CRF/SP 4.142

Nº do lote, data da fabricação e data da validade: vide embalagem.

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em (14/11/2016).



Farmácia e Laboratório Homeopático

**ALMEIDA PRADO** Ltda.

Praça Benedito Calixto 129/133 - São Paulo-SP

CNPJ 60.862.208/0001-41 - Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 08000-116311