

BULA AO PACIENTE

POMADA MINANCORA

cloreto de benzalcônio / óxido de zinco / cânfora

APRESENTAÇÃO

Forma farmacêutica: Pomada

Concentração dos princípios ativos: cloreto de benzalcônio 0,005 g/g, óxido de zinco 0,200 g/g, cânfora 0,050 g/g.

Peso líquido: 30g

“USO TÓPICO / EXTERNO” / “USO ADULTO”

“NÃO DEVE SER USADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE”

COMPOSIÇÃO:

cloreto de benzalcônio 0,005 g/g, óxido de zinco 0,200 g/g, cânfora 0,050 g/g óleo mineral, cera de abelhas, corante CI 16255 em propilenoglicol, butilidroxitolueno, parafina – Q.S.P. 30,0g.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A POMADA MINANCORA é destinada para tratamento de doenças de pele tais como: espinhas, frieiras (desidroses), escaras e ainda como coadjuvante no tratamento de picadas de insetos, urticárias e pequenos ferimentos superficiais inclusive os ocasionados pelo barbear. Previne os odores desagradáveis das axilas e dos pés e o ressecamento da pele.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A POMADA MINANCORA é um medicamento antisséptico, adstringente e cicatrizante que tem como finalidade a prevenção e o tratamento das doenças da pele.

Antisséptico: Utilizado para inibir a proliferação de microrganismos presentes na superfície da pele

Adstringente: Contraí os tecidos da pele, reduzindo as secreções e formando uma camada protetora, contribuído para diminuição da inflamação.

Cicatrizante: produto que favorece a cicatrização.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contra-indicado para menores de 2 anos.

Este medicamento é contra-indicado para uso em indivíduos hipersensíveis aos componentes da fórmula.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Até o momento, não foram relatadas quaisquer interações medicamentosas com a POMADA MINANCORA.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Este medicamento é contra-indicado para menores de 2 anos.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

A POMADA MINANCORA deve ser conservada em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C), local seco e protegido da luz.

“Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem”

“Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.”

“Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo”.

“Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.”

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A POMADA MINANCORA é indicada para uso Externo/ Tópico.

Aplicar uma fina camada da POMADA MINANCORA, na quantidade suficiente para cobrir a região afetada, sobre a pele limpa e seca, duas vezes ao dia (a cada 12 horas).

Não utilizar a POMADA MINANCORA em mucosas e/ou ferimentos abertos, pois poderão ocorrer irritações. Caso o produto entre em contato com os olhos, região mucosa, ferimentos abertos retire o produto delicadamente e procure orientação médica.

Duração de tratamento: A POMADA MINANCORA é indicada para tratamento sintomático.

Via de administração: A POMADA MINANCORA é indicada para uso Externo/ Tópico.

“USO TÓPICO / EXTERNO” / “USO ADULTO”

“NÃO DEVE SER USADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE”

A Superdosagem da POMADA MINANCORA, por uso tópico, não é conhecida, portanto utilize a POMADA MINANCORA, conforme indicação, ou seja, duas vezes ao dia.

“Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.”

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

“Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista”

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

A ocorrência de reação adversa com o uso do produto é muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): Todas as reações adversas ocorrem na pele e caracterizam-se por dermatite de contato, sendo esta ardência, hiperemia (vermelhidão), prurido (coceira), formação de pápulas (elevação da pele) e vesículas (pequenas bolhas) e exsudato (secreção), podendo evoluir para descamação e crostas.

“Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço atendimento ao Consumidor (SAC)”.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

O quadro clínico por ingestão acidental ou superdosagem, ainda não é conhecido. Na eventualidade, adotar as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

“Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800-7226001, se você precisar de mais orientações”.

DIZERES LEGAIS

MS 1.0690.0003.002-6

Farmacêutico Responsável: Thaís C. K. Kracochansky CRF/SC 18415

Minancora & Cia Ltda.

Rua Dona Francisca, 14.795 Joinville – SC

CNPJ 84.683.382/0003-57

Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento Ao Consumidor (SAC) 0800 0 46 76 76.

“Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica”

