

Polvilho Antisséptico Granado

Casa Granado Laboratórios Farmácias e Drogarias S.A.

Pó

Ácido Salicílico - 0,352g

Enxofre - 17,602g

Ácido Bórico - 3,0g

Óxido de zinco - 11,735g

Nome comercial:
POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO

Denominação genérica dos princípios ativos:
ÁCIDO SALICÍLICO + ENXOFRE + ÁCIDO BÓRICO + ÓXIDO DE ZINCO

APRESENTAÇÃO: Pó acondicionado em frasco plástico de peso líquido 100g ou 200g.

USO TÓPICO
USO EXCLUSIVO EM ADULTO, ACIMA DE 12 ANOS

Composição

Cada 100g do medicamento contém:
Ácido Salicílico 0,352g, Enxofre 17,602g, Ácido Bórico 3,0g, Óxido de Zinco 11,735g
Excipientes: amido e talco.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado para combater assaduras, brotoejas e os odores da transpiração dos pés e axilas. Para prevenir pruridos e frieiras. Para combater as micoses entre os dedos dos pés.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotoejas e odores da transpiração. O ácido bórico e o enxofre tem ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE.

NÃO PODERÁ SER APLICADO EM GRANDES ÁREAS DO CORPO, QUANDO EXISTIREM LESÕES DE QUALQUER TIPO, FERIDAS OU QUEIMADURAS. INFORME AO MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

CONSERVAR ESTE MEDICAMENTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL, PROTEGIDO DA UMIDADE E AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação. Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de esquecimento o tratamento deve prosseguir normalmente.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação do seu médico.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

É geralmente bem tolerado e não apresenta contra-indicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

“Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.”

“Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis com este medicamento, entrando em contato através do sistema de atendimento ao consumidor (SAC)”.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, suspenda o uso e procure orientação médica.

DIZERES LEGAIS:

M.S. - 1. 0817.0030.0025

Farmacêutico Responsável: Luciana Chaves Tourinho

CRF-RJ: 8983

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0001-17

Avenida Barão de Tefé nº34, andar 14º e 15º, Rio de Janeiro, RJ

Fabricado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0004-60

- Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: Tel.: 0800 940 6730 / sac@granado.com.br / www.granado.com.br

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

As expressões “**POLVILHO ANTISSÉPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S.A.

Polvilho Antisséptico Granado Fresh
Casa Granado Laboratórios Farmácias e Drogarias S.A.

Pó

Ácido Salicílico - 0,352g

Enxofre - 17,602g

Ácido Bórico - 3,0g

Óxido de zinco - 11,735g

Nome comercial:
POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO FRESH

Denominação genérica dos princípios ativos:
ÁCIDO SALICÍLICO + ENXOFRE + ÁCIDO BÓRICO + ÓXIDO DE ZINCO

APRESENTAÇÃO: Pó acondicionado em frasco plástico de peso líquido 100g.

USO TÓPICO

USO EXCLUSIVO EM ADULTO, ACIMA DE 12 ANOS

Composição

Cada 100g do medicamento contém:

Ácido Salicílico 0,352g, Enxofre 17,602g, Ácido Bórico 3,0g, Óxido de Zinco 11,735g

Excipientes: aromatizante, amido e talco.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado para combater assaduras, brotoejas e os odores da transpiração dos pés e axilas. Para prevenir pruridos e frieiras. Para combater as micoses entre os dedos dos pés.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotoejas e odores da transpiração. O ácido bórico e o enxofre tem ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE.

NÃO PODERÁ SER APLICADO EM GRANDES ÁREAS DO CORPO, QUANDO EXISTIREM LESÕES DE QUALQUER TIPO, FERIDAS OU QUEIMADURAS. INFORME AO MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

CONSERVAR ESTE MEDICAMENTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL, PROTEGIDO DA UMIDADE E AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de esquecimento o tratamento deve prosseguir normalmente.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação do seu médico.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

É geralmente bem tolerado e não apresenta contra-indicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

“Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.”

“Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis com este medicamento, entrando em contato através do sistema de atendimento ao consumidor (SAC)”.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, suspenda o uso e procure orientação médica.

DIZERES LEGAIS:

M.S. - 1. 0817.0030.0041

Farmacêutico Responsável: Luciana Chaves Tourinho
CRF-RJ: 8983

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0001-17

Avenida Barão de Tefé nº34, andar 14º e 15º, Rio de Janeiro, RJ

Fabricado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0004-60

- Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: Tel.: 0800 940 6730 / sac@granado.com.br / www.granado.com.br

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

As expressões “**POLVILHO ANTISSÉPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S.A.

Polvilho Antisséptico Granado Sport
Casa Granado Laboratórios Farmácias e Drogarias S.A.

Pó

Ácido Salicílico - 0,352g

Enxofre - 17,602g

Ácido Bórico - 3,0g

Óxido de zinco - 11,735g

Nome comercial:
POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO SPORT

Denominação genérica dos princípios ativos:
ÁCIDO SALICÍLICO + ENXOFRE + ÁCIDO BÓRICO + ÓXIDO DE ZINCO

APRESENTAÇÃO: Pó acondicionado em frasco plástico de peso líquido 100g.

USO TÓPICO

USO EXCLUSIVO EM ADULTO, ACIMA DE 12 ANOS

Composição

Cada 100g do medicamento contém:

Ácido Salicílico 0,352g, Enxofre 17,602g, Ácido Bórico 3,0g, Óxido de Zinco 11,735g

Excipientes: aromatizante, amido e talco.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado para combater assaduras, brotoejas e os odores da transpiração dos pés e axilas. Para prevenir pruridos e frieiras. Para combater as micoses entre os dedos dos pés.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotoejas e odores da transpiração. O ácido bórico e o enxofre tem ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE.

NÃO PODERÁ SER APLICADO EM GRANDES ÁREAS DO CORPO, QUANDO EXISTIREM LESÕES DE QUALQUER TIPO, FERIDAS OU QUEIMADURAS. INFORME AO MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

CONSERVAR ESTE MEDICAMENTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL, PROTEGIDO DA UMIDADE E AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de esquecimento o tratamento deve prosseguir normalmente.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação do seu médico.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

É geralmente bem tolerado e não apresenta contra-indicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

“Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.”

“Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis com este medicamento, entrando em contato através do sistema de atendimento ao consumidor (SAC)”.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, suspenda o uso e procure orientação médica.

DIZERES LEGAIS:

M.S. - 1. 0817.0030.0068

Farmacêutico Responsável: Luciana Chaves Tourinho
CRF-RJ: 8983

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0001-17

Avenida Barão de Tefé nº34, andar 14º e 15º, Rio de Janeiro, RJ

Fabricado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0004-60

- Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: Tel.: 0800 940 6730 / sac@granado.com.br / www.granado.com.br

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

As expressões “**POLVILHO ANTISSÉPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S.A.

Polvilho Antisséptico Granado Pink

Casa Granado Laboratórios Farmácias e Drogarias S.A.

Pó

Ácido Salicílico - 0,352g

Enxofre - 17,602g

Ácido Bórico - 3,0g

Óxido de zinco - 11,735g

Nome comercial:
POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO PINK

Denominação genérica dos princípios ativos:
ÁCIDO SALICÍLICO + ENXOFRE + ÁCIDO BÓRICO + ÓXIDO DE ZINCO

APRESENTAÇÃO: Pó acondicionado em frasco plástico de peso líquido 100g.

USO TÓPICO

USO EXCLUSIVO EM ADULTO, ACIMA DE 12 ANOS

Composição

Cada 100g do medicamento contém:

Ácido Salicílico 0,352g, Enxofre 17,602g, Ácido Bórico 3,0g, Óxido de Zinco 11,735g

Excipientes: aromatizante, amido e talco.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado para combater assaduras, brotoejas e os odores da transpiração dos pés e axilas. Para prevenir pruridos e frieiras. Para combater as micoses entre os dedos dos pés.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotoejas e odores da transpiração. O ácido bórico e o enxofre tem ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE.

NÃO PODERÁ SER APLICADO EM GRANDES ÁREAS DO CORPO, QUANDO EXISTIREM LESÕES DE QUALQUER TIPO, FERIDAS OU QUEIMADURAS. INFORME AO MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

CONSERVAR ESTE MEDICAMENTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL, PROTEGIDO DA UMIDADE E AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de esquecimento o tratamento deve prosseguir normalmente.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação do seu médico.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

É geralmente bem tolerado e não apresenta contra-indicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

“Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.”

“Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis com este medicamento, entrando em contato através do sistema de atendimento ao consumidor (SAC)”.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, suspenda o uso e procure orientação médica.

DIZERES LEGAIS:

M.S. - 1. 0817.0030.0084

Farmacêutico Responsável: Luciana Chaves Tourinho
CRF-RJ: 8983

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0001-17

Avenida Barão de Tefé nº34, andar 14º e 15º, Rio de Janeiro, RJ

Fabricado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0004-60

- Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: Tel.: 0800 940 6730 / sac@granado.com.br / www.granado.com.br

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

As expressões “**POLVILHO ANTISSÉPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S.A.

